

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

第2類医薬品

漢方製剤

# のどがはれて痛む扁桃炎・扁桃周囲炎に き きょうとう [救心漢方] 桔梗湯エキス散

【救心漢方】桔梗湯エキス散は、漢方医学の原典『傷寒論』、『金匱要略』に記載されている「桔梗湯」をのみやすい微粒状のエキス散剤としたものです。

「桔梗湯」は、のどの痛みに使用する「甘草湯」に、消炎効果のある「桔梗」を加えた薬方で、のどが赤くはれて痛む扁桃炎や扁桃周囲炎などに用いられます。

◆【救心漢方】桔梗湯エキス散は、次のような症状（扁桃炎・扁桃周囲炎）を目標として使用すると、すぐれた効きめを発揮します。

- ◇かぜなどにより、のどが赤くはれて痛む
- ◇のどの使いすぎで、のどがはれて痛む
- ◇気候の急激な変化によって、のどがはれて痛む
- ◇のどのはれや痛みで、異物感があり、ものをのみ下しにくい
- ◇のどがはれて、声がかすれ、咳や痰が出る

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる】  
次の人は服用しないこと  
生後3カ月未満の乳児

### 🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- (4) 高齢者
- (5) 次の症状のある人  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談すること

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6回服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談すること

## 効 能

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛み、ときにせきがでるものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

## 用法・用量

食前または食間に少しずつ口中に含み、水またはお湯で徐々に溶かして服用すること

年 齢	1 回量	服用回数
大人（15才以上）	1包	1日3回
7～14才	$\frac{2}{3}$ 包	
4～6才	$\frac{1}{2}$ 包	
2～3才	$\frac{1}{3}$ 包	
2才未満	$\frac{1}{4}$ 包	

食間とは…  
食後2～3時間を指します。

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させること

### 【効果的なのみ方】

本剤は、一息にのみほさずに、少しずつ口に含み、水またはお湯でゆっくり溶かすようにしておのみください。有効成分が炎症を起こしているのどに直接作用して、より効果的です。

## 成 分

【救心漢方】桔梗湯エキス散は、黄かっ色の微粒状の散剤で、3包（1包1.5g）中、下記生薬の抽出乾燥エキス（桔梗湯乾燥エキス）1,470mgを含有します。

[キキョウ……………2.0g、カンゾウ……………3.0g]

添加物として乳糖、部分アルファー化デンプン、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸を含有します。

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

救心製薬株式会社 お客様相談室

電話：03-5385-3211（代表）

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）



救心製薬株式会社

東京都杉並区和田1-21-7