

心臓の衰弱、貧血症

しん しん 神 心

神心は、江戸時代の医家である原南陽が著した『叢桂亭医事小言』に記載されている「**鍼砂湯**」を基本とした製剤です。

「**鍼砂湯**」は漢方医学の原典『傷寒論』、『金匱要略』に記載されている「**苓桂朮甘湯**」にニンジン、ボレイ、**鍼砂**(鉄粉)を加えた薬方で、貧血があり、心臓の衰弱時のどうきや息切れ、めまい、むくみなどがある場合に用いられます。

神心は、この「**鍼砂湯**」を構成する生薬にシソシ、セキイ、モッコウ、カンキョウなどを配合した製剤で、循環、補血、利尿、滋養などの作用により体のさまざまな機能を整えて、心臓の衰弱や貧血症に効果を現します。

神心は、次のような症状を目標として使用すると、すぐれた効きめを発揮します。

- ◇貧血によりどうきや息切れがする……
- ◇貧血気味でめまいや立ちくらみなどを起こしやすい……
- ◇心臓の衰弱により、体がむくんだり、顔色が悪い……

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる〕

1. 次の人は服用しないこと
生後3ヵ月未満の乳児
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないこと
他の貧血用薬

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
 - (3) 高齢者
 - (4) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (5) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 次の症状のある人
むくみ
 - (7) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談すること
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合
3. 長期連用する場合には、医師または薬剤師に相談すること
4. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること
便秘、下痢

効 能

心臓の衰弱、貧血症

用法・用量

食間に水またはお湯で服用すること

年 齢	1 回量	服用回数
大人（15才以上）	1 包	1日3回
7～14才	1/2包	
4～6才	1/3包	
2～3才	1/6包	
2才未満	1/10包	

食間とは…
食後2～3時間を
指します。

- (1) 服用の前後30分はお茶・コーヒー等を飲まないこと
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること
- (3) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合のみ服用させること

成 分

3包（1包2g）中、下記生薬を含有します。

ケイヒ	1.071g	カンゾウ	1.071g	ニンジン	0.375g
ボレイ	1.071g	ブクリョウ	0.375g	セキイ	0.375g
シソシ	0.375g	ビャクジュツ	0.375g	モッコウ	0.375g
カンキョウ	0.375g	鉄 粉	0.161g		

添加物は含有しておりません。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
 - (2) 小児の手の届かない所に保管すること
 - (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる。）
 - (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること
 - (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと
- ☆本剤は天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異を生ずることがありますが、品質には変わりありません。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

救心製薬株式会社 お客様相談室

電話：03-5385-3211（代表）

受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

発売元 **救心製薬株式会社**
東京都杉並区和田1-21-7

製造販売元 **株式会社 建林松鶴堂**
埼玉県戸田市戸田公園3-7