

第2類医薬品

# 柴胡桂枝湯エキス配合 救心のかぜ薬白箱

「かぜは万病のもと」といわれ、こじらせるといろいろな病気をひき起こすようになります。

ひきはじめのうちに、できるだけ早く治療することが大切ですが、無理をして長びいてしまうことも少なくありません。

救心のかぜ薬白箱は、長びいたり胃腸症状を伴ったりするかぜに古くから用いられてきた漢方処方〈柴胡桂枝湯〉のエキスに、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤、鎮咳去痰剤などを配合したかぜ薬です。漢方薬と洋薬の特有の作用で、ひきはじめはもちろん、長びいたかぜにも、すぐれた効きめをあらわします。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる〕

#### 1. 次の人は服用しないこと

- (1) 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2) 本剤または他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人

#### 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）

#### 3. 服用後、乗物または機械類の運転操作をしないこと

（眠気があらわれることがある。）

#### 4. 服用時は飲酒しないこと

#### 5. 長期連用しないこと



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談すること

- (1) 医師または歯科医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人
- (3) 本人または家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある
- (5) 次の症状のある人 高熱、排尿困難
- (6) 次の診断を受けた人 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

#### 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談すること

##### (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
その他	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しさ等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群)、 中毒性表皮壊死症 (ライエル症候群)	高熱を伴って、発疹・発赤、火傷様の水ぶくれ等の激しい症状が、全身の皮膚、口や目の粘膜にあらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる。
間質性肺炎	空せき（たんを伴わないせき）を伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる。（これらの症状は、かぜの諸症状と区別が難しいこともあり、空せき、発熱等の症状が悪化した場合にも、服用を中止するとともに、医師の診療を受けること）
ぜんそく	

(2)5~6回服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談すること  
□のかわき

## 効能

かぜの諸症状(せき、たん、鼻みず、鼻づまり、頭痛、発熱、悪寒、くしゃみ、のどの痛み、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## 用法・用量

食後なるべく30分以内に水またはお湯で服用すること

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	1包	1日3回
11~14才	$\frac{2}{3}$ 包	
7~10才	$\frac{1}{2}$ 包	
3~6才	$\frac{1}{3}$ 包	
3才未満	服用しないこと	

(1)用法・用量を厳守すること

(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

## 成分と作用

救心のかぜ薬白箱は、灰かっ色の顆粒で、3包(1包1.2g)中に次の成分を含んでいます。

成分	3包中	作用
柴胡桂枝湯乾燥エキス (サイコ1.0g、ハンゲ0.8g、ケイヒ0.6g、シャクヤク0.6g、オウゴン0.4g、ニンジン0.4g、タイソウ0.4g、カンゾウ0.4g、ショウキョウ0.2g 全量4.8gより抽出した乾燥エキス) (漢方薬)	720mg	漢方医学の原典『傷寒論』に収載され、古くからかぜの治療に用いられてきました。特に、長びいたり、はき気や腹痛などの胃腸症状を伴ったりするかぜの頭痛、発熱、悪寒などに効果を発揮します。
アセトアミノフェン (解熱鎮痛剤)	900mg	熱を下げ、頭痛やのど、関節、筋肉などの痛みをしずめます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 (抗ヒスタミン剤)	3.5mg	くしゃみ、鼻みず、鼻づまりなどのアレルギー症状をおさえます。
チペピジンヒベンズ酸塩 (鎮咳去痰剤)	75mg	せきをしずめ、たんを切ります。
無水カフェイン (カフェイン剤)	60mg	痛みをしずめるはたらきを助けます。

添加物として乳糖、サッカリンNa、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、二酸化ケイ素を含有します。

## 保管および取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2)小児の手の届かない所に保管すること
- (3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願いいたします。

救心製薬株式会社 お客様相談室

電話:03-5385-3211(代表)

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)



救心製薬株式会社  
東京都杉並区和田1-21-7